



INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

Hidratação subcutânea ao paciente com AIDS

Mello¹, SHS; Cavalcanti², NJF

¹ Enfermeira, Mestre em Saúde Pública, Membro da Equipe Interdisciplinar de Cuidados Paliativos do IIER;

² Professor Doutor responsável pelo programa de pós-graduação do IIER, Presidente da CCIH do IIER



Objetivo geral:

Avaliar o perfil do paciente com aids em cuidados paliativos quanto à elegibilidade da realização de hipodermóclise

Objetivo específico:

Analisar os critérios de indicação para hipodermóclise em pacientes de Cuidados Paliativos com aids.


Metodologia:

Estudo retrospectivo, quantitativo, exploratório e descritivo, realizado através de análise de prontuários, no período de janeiro de 2004 a agosto de 2005, dos pacientes com diagnóstico de aids, acompanhados pela Equipe Interdisciplinar de Cuidados Paliativos. Foram incluídos os pacientes maiores de 18 anos e em fase avançada da doença. Foram excluídos os pacientes com desidratação severa, em risco de congestão pulmonar, insuficiência cardíaca e distúrbios de coagulação. Os dados coletados foram representados por frequência relativa (%) e absoluta (n), sendo utilizado o teste de Quiquadrado. Foi considerado nível de significância igual ou maior a 0,05 (alfa = 5%).


Resultados:

Foram analisados 89 prontuários, sendo 6 excluídos. Do total, 68,67% (57) eram do gênero masculino e 31,33% (26) do gênero feminino.

Gráfico 1 - Indicações para Hipodermóclise na fase avançada da doença.



APOIO




CENTRO DE ESTUDOS "EMÍLIO RIBAS"

Tabela 1 - Análise da Correlação das Indicações para Hipodermóclise com Falência de Múltiplos Órgãos, Neoplasias, Hepatite C, Candidíase, Uso de Drogas Injetáveis, Dor e Óbitos

Parâmetro A (N)	Parâmetro B (N)	Pacientes (T)	P
Falência Múlt. Órgãos (13)	Óbito (37)	83	<0,01*
Neoplasia (26)	Dor (33)	83	<0,01*
Uso de Opióide (21)	Dor (33)	83	<0,01*
Terminalidade (42)	Albumina Alterada (33)	70	<0,01*
Uso de Opióide (21)	Disfagia (28)	83	0,029*
Rede Venosa Ruim (33)	Disfagia (28)	83	0,01*
Rede Venosa Ruim (33)	Albumina Alterada (33)	70	0,039*
Candidíase Orocefálica (31)	Disfagia (28)	83	0,029*
Usuário de Drogas (18)	Hepatite C (11)	83	0,04*

Gráfico 2 - Principais Complicações Associadas hipodermóclise



Conclusões:

- Medicação e ou Hidratação por Hipodermóclise ⇒ 93,25% (83 de 89)
- Mais de uma indicação para a realização de hipodermóclise ⇒ 78,31% (65/83)
- Variáveis ⇒ Ocorrência de óbito maior em pacientes com falência de múltiplos órgãos
- Neoplasias ⇒ Dor e Uso de Opióides
- Rede Venosa Ruim ⇒ Nível de albumina alterado ($\leq 3,0$); Dificuldade de hidratação
- Candidíase ⇒ Disfagia
- Drogas Injetáveis Ilícitas ⇒ Hepatite C
- Existe a necessidade da realização da hidratação subcutânea em pacientes com aids, e efetivo controle e observação dos possíveis efeitos colaterais